



PROMIAU ES UNA INICIATIVA DE BAYER QUE TIENE COMO FINALIDAD VELAR POR LA SALUD Y EL BIENESTAR DE NUESTROS GATOS.

A través de Promiau se ofrece información de interés sobre prevención y detección de posibles problemas de salud de los gatos y consejos para un mejor cuidado y atención a nuestros felinos.



Si eres un amante de los gatos, únete a nosotros a través de promiau.com.

Si deseas saber más sobre gatos puedes encontrar información fidedigna y actualizada sobre temas de salud del gato en el microsite de GEMFE-AVEPA: www.fabcats.org/fvf/gemfe/





TRASLADAR A UN GATO

Los gatos desarrollan estrechos lazos con su entorno así que cualquier cambio podría generarles cierto nivel de estrés. Para ello es importante preparar el traslado siguiendo unas sencillas pautas.



1. PREPARAR EL TRASLADO

- Si tu gato se muestra intranquilo en los viajes, coméntalo previamente a tu veterinario.
- Aliméntalo de forma habitual pero es recomendable que la hora de la comida sea al menos 3 horas antes del traslado/viaje.
- Acostumbra previamente al gato al transportín: es importante que el gato lo asocie a experiencias positivas y lo use de forma habitual. Se pueden usar juguetes con olor a catnip (planta con efecto relajante) o sus juguetes habituales.

2. EL TRASLADO

- Transporta al gato en un transportín de la forma que se sienta más seguro y colócalo en un lugar elevado.
- 30 minutos antes del traslado utiliza feromonas felinas sintéticas para relajarlo.
- Procura que el gato entre voluntariamente en el transportín. Si fuera necesario, quitar la parte superior y cuando entre, colócala de nuevo.

Recomendaciones sobre el transportín

El diseño debe permitir que el gato se saque con facilidad. Si no quisiera salir, debe permitir que se le pueda examinar en la parte inferior del transportín.

DESPARASITACIÓN INTERNA

- El 28% de los gatos de España tienen parásitos intestinales*
- 16,6 % de los gatos caseros (que no salen de casa) también los tienen*

- Los gatos con parásitos pueden presentar pérdida de peso, vómitos, diarrea e irritación del ano.
- Son un riesgo de zoonosis (afecta al ser humano).

Por ello se recomienda desparasitar de forma periódica al gato:

- En gatitos a partir de las 6 semanas cada 2 semanas hasta las 16 semanas de vida.
- En gatos adultos 4 veces al año.



Consulta con tu veterinario cómo aplicar la pipeta vía tópica, la forma más cómoda de desparasitar a tu gato.

*Fuente: estudio Seroprevalencia de *Toxoplasma Gondii* y parásitos intestinales en gatos callejeros, gatos de criaderos y gatos caseros en España.

Guadalupe Miró*, Ana Montoya*, Santos Jimenez*, Carolina Frisuelos*, Marta Mateo*, Isabel Fuentes*

* Departamento de Sanidad Animal, Facultad de Veterinaria, Avda Puerta del Hierro, 28040 Madrid, España.

* Consejería de Salud 26071 Logroño, La Rioja, España.

* Servicio de Parasitología, Centro Nacional de Microbiología ISCIII, 28224 Majadahonda, Madrid, España.



LAS PULGAS EN EL GATO



- Las pulgas son transmisoras de la "enfermedad del araño" que afecta al hombre provocando inflamación del ganglio y fiebre.
- La pulga puede transmitir la tenia *Dypilidium caninum*.
- Se alimentan de la sangre del gato, lo que puede producirles debilidad, anemia y muerte.
- En algunos casos, los gatos pueden desarrollar alergia a la picadura de pulga con fuertes picores y rascado.
- Las pulgas también pueden picar a las personas.
- No es fácil descubrir pulgas adultas ya que suelen ingerirlas mientras se acicalan. El único síntoma puede ser que el gato se rasque o que detectéis picaduras de insecto en algunas zonas.

¿Qué se debe hacer?

- Consulta con tu veterinario sobre la mejor opción para combatir las pulgas (pipeta spot-on o collar antiparasitario).
- Aunque el gato no salga de casa, existe riesgo de infestación por pulgas.
- Las condiciones de temperatura y humedad de una casa son ideales para producir una infestación por pulgas.



ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA

La función principal del RIÑÓN es la filtración de productos de deshecho/toxinas y la regulación de agua, minerales y electrolitos.

- Es una de las enfermedades más comunes en los gatos mayores.
- La enfermedad renal crónica se produce cuando existe un daño en los riñones prolongado e irreversible que no permite que realicen su función.
- El fallo renal es progresivo, de modo que hay un avance gradual de la enfermedad y un empeoramiento de los síntomas.

**1 DE CADA 3 GATOS MAYORES
PADECE ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA.**



Síntomas

- Falta de apetito.
- Pérdida peso.
- Deshidratación
- Letargia y depresión.
- Pueden tener mucha sed y producir mucha orina.

¿Qué se debe hacer?

- Es recomendable hacer un chequeo renal a través de una analítica sanguínea y/o de orina.
- Consulta a tu veterinario ante cualquier indicio de enfermedad de tu gato.



SI TU GATO DEJA DE COMER...

LA LIPIDOSIS HEPÁTICA es una enfermedad muy grave que puede acabar con la vida del animal si no se instaura un tratamiento adecuado.



- Los gatos son pacientes que esconden muy bien sus síntomas, es decir, hasta que la enfermedad que sufran no esté avanzada no mostrarán signos claros de enfermedad.
- Si un gato deja de comer probablemente esté sufriendo alguna enfermedad.
- Además, si tu gato deja de comer podría sufrir una lipidosis hepática. Se trata de una acumulación de grasa en el hígado que provoca daño y disfunción. Al no ingerir alimento se provoca un cambio de metabolismo liberando grasa desde el tejido graso al torrente sanguíneo.
- Los gatos con sobrepeso que dejan de comer son los que presentan un riesgo mayor de desarrollar esta enfermedad.

¿Qué se debe hacer?

- No dejes a tu gato más de tres días sin comer y acude inmediatamente al veterinario.
- Si un gato deja de comer existe un riesgo real de padecer una lipidosis hepática.



DIARREA

LA DIARREA PUEDE VENIR CAUSADA POR:

- Dieta.
- Parásitos intestinales: gusanos, protozoos (coccidios, giardias, tritrichomonas)
- Virus y bacterias.
- Enfermedades sistémicas como el hipertiroidismo.



Síntomas

Cuando las heces del gato se vuelven blandas (incluso acuosas) o cambian de color estamos ante un caso de diarrea. En algunas ocasiones incluso puede ir acompañada de sangre fresca o con moco en las heces.

¿Qué se debe hacer?

- Si detectas un cambio en la consistencia de las heces, consulta con el veterinario.
- Desparasita internamente a tu gato cuatro veces al año.
- Sigue la dieta aconsejada por tu veterinario.



HIGIENE DEL GATO



MALTA

- Los gatos ingieren pelos durante su higiene diaria, que pueden formar bolos que se expulsan por vómitos y heces. Estas bolas de pelo pueden llegar a provocar obstrucciones.

¡Acostumbra a tu gatito a recibir su dosis diaria de Malta!

- Malta de Bayer, con su apetecible sabor ayuda a eliminar las bolas de pelo.

VETRIDERM

- Si tienes alergia a tu gato, Vetriderm reduce los alérgenos de tu mascota y te ayuda a convivir con ella.

Consulta con tu veterinario.



sano
& bello



vetriderm
LOCION TOPICA

reduce los alérgenos,
convive con la mascota